


کمپوسٹ کی تیاری اور استعمال

صوبہ بلوچستان کے

کسانوں کی رہنمائی کے لیے


کمپوسٹ اور اس کے فائدے



کمپوسٹ کی تیاری



کمپوسٹ کا استعمال



مؤلفین



ہارٹیکچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ

ڈاکٹر تاج نصیب خان

ہمایوں خان

ڈائریکٹر

پرنسپل سائنٹیفک آفیسر

پرنسپل سائنٹیفک آفیسر

پرنسپل سائنٹیفک آفیسر

ڈاکٹر غلام جیلانی

ڈاکٹر ہدایت اللہ



ایگریکلچر پالیٹیکنک انسٹیٹیوٹ

ڈائریکٹر

محمد انور



ڈائریکٹوریٹ زراعت شعبہ توسیع بلوچستان

ڈائریکٹر جنرل

ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز

انعام الحق

محمد ندیم ارشد




زرعی زمینوں کی پیداوار بڑھانے میں کھادوں کا اہم کردار ہے، کھادوں کی ضرورت تین طریقوں سے پوری کی جاتی ہے:

2 جانوروں کے فضلے کی کھاد



گوبر کی کھاد اگر پوری طرح گلی سڑی نہ ہو تو یہ جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ دیمک وغیرہ کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتی ہے جس سے پیداوار کم ہو جاتی ہے

1 کیمیائی کھادیں



کیمیائی کھادیں بہت مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی دستیابی بھی ہر جگہ ممکن نہیں ہے

کمپوسٹ

3


کمپوسٹ کے استعمال سے زمین نرم، بھر بھری اور زرخیز ہو جاتی ہے، کیونکہ کمپوسٹ سے زمین میں نامیاتی مادہ بڑھ جاتا ہے۔ کمپوسٹ تین طرح سے زمین کی پیداواری صلاحیت بڑھاتی ہے:

1 زمین میں نامیاتی مادہ زیادہ ہونے سے زمین کی کیمیائی،

حیاتیاتی اور بناوٹی ساخت بہتر ہو جاتی ہے اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔

2 اجزاء خوراک کی حل پذیری زیادہ ہونے سے زمین کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔

3 زمین میں فائدہ مند جراثیموں اور کیڑے مکوڑوں کی تعداد زیادہ ہونے سے نقصان دہ کیڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔





کمپوسٹ کی تیاری

2

کمپوسٹ تیار کرنے کا مواد یا اجزاء

2.1

 درختوں کے پتے اور شاخیں	 گندم یا چاولوں کا ٹھوسہ	 پودوں کی باقیات	 جانوروں کا فضلہ
 گھاس پھوس	 لکڑی کی چھال	 باورچی خانے کا کچرا	 لکڑی کا چورا یا بڑا دا

کمپوسٹ کے ممکنہ اجزاء کی ترکیب


2.2

تیسری ترکیب	دوسری ترکیب	پہلی ترکیب
■ باورچی خانے کی باقیات ■ سبزیاں اور ان کے چھلکے ■ مٹی 2 فیصد ■ حل شدہ راب اور خمیر کے ■ ساتھ 200 لیٹر پانی	■ پودوں کی شاخیں، ڈالیاں اور تراشے ■ گھاس اور لکڑی کا چورا ■ بھورا کوئلہ ■ مٹی 2 فیصد ■ حل شدہ راب اور خمیر کے ■ ساتھ 200 لیٹر پانی	■ جانوروں کا فضلہ ■ مرغیوں کی بیٹ ■ گنے کی مڈ یعنی شوگر مل کا فضلہ ■ مٹی 2 فیصد ■ حل شدہ راب اور خمیر کے ■ ساتھ 200 لیٹر پانی



کمپوسٹ میں کیانہ ڈالیں؟


2.3



بلی اور کتے کا پاخانہ




متاثرہ یا بیمار پودوں کے پتے



ہڈی، گوشت، چربی یا تیل والی اشیاء



موٹی ٹہنیاں یا لکڑی وغیرہ



دودھ یا ڈیری مصنوعات



دھاتیں، شیشہ، پلاسٹک، کاغذ اور
ریشمی کپڑا وغیرہ

کمپوسٹ تیار کرنے کی تجاویز

2.4



آکسیجن



درجہ حرارت



پانی

- 2 فیصد آکسیجن کا ہونا ضروری ہے۔
- زیادہ آکسیجن میں جرثومے ٹھنڈ کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔
- کم آکسیجن میں بھی جرثومے مر جاتے ہیں۔

- 60 سے 70 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ ہو تاکہ جرثومے زندہ رہیں۔
- گرمی میں دھوپ اور خشکی کے لیے پلاسٹک شیٹ سے ڈھانپیں۔
- کمپوسٹ ہمیشہ سایہ دار جگہوں پر تیار کریں۔
- سردی میں کم درجہ حرارت کی وجہ سے عمل آہستہ ہو گا۔
- بارشوں میں پلاسٹک شیٹ ڈالیں تاکہ غذائی اجزاء محفوظ رہیں۔

- 50 فیصد جذبی صلاحیت ہو، اگر کمپوسٹ کو ہاتھ سے دبایا جائے تو اس میں سے پانی نہیں نکلے گا۔
- زیادہ پانی: جرثومے ڈوب / مر جاتے ہیں۔
- کم پانی: جرثومے خشکی کی وجہ سے سست پڑ جاتے ہیں۔

سردیوں میں پانچ سے چھ ماہ

دورانیہ

کمپوسٹ

گرمیوں میں تین سے چار ماہ



زمین میں 3 فٹ گہرا، 3 فٹ چوڑا اور 4 سے 6 فٹ لمبا
گڑھا کھودیں یا 9 مربع فٹ کا ڈھیر بنائیں



بڑی شاخوں، ہڈیوں، کاغذی گتوں، پلاسٹک، شیشہ اور
رہڑ کو نکال دیں



نامیاتی مواد کی 6 سے 9 انچ موٹی تہہ کے اوپر مٹی کی
1 انچ تہہ لگائیں



مٹی کی تہوں پر جانوروں کے فضلے، گوبر کی کھاد،
امونیم نائٹریٹ کا چھڑکاؤ کریں، نائٹروجن کو جراثیم
استعمال کرتے ہیں اس سے ڈھیر کے گلنے سڑنے
کا عمل تیز ہو جاتا ہے





پانچواں مرحلہ



گرمیوں میں خشکی ہونے پر کبھی کبھار پانی چھڑکائیں، پانی کم استعمال کریں تاکہ گلنے سڑنے کا عمل متاثر نہ ہو۔ زیادہ پانی آکسیجن کو کم کرے گا اور گلنے سڑنے کا عمل آہستہ ہو گا۔

چھٹا مرحلہ



ابتدائی حرارت مل جانے کے بعد ڈھیر کو ہلانا درست ہو گا، زیادہ حرارت ڈھیر میں موجود نقصان دہ کیڑوں اور گھاس کے بیجوں کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے۔

ساتواں مرحلہ



گلنے سڑنے کا عمل چند مہینوں (گرمیاں 3 سے 4 ماہ، سردیاں 5 سے 6 ماہ) میں مکمل ہوتا ہے تیار ہونے پر یہ گہری بھوری یا کالی رنگت اختیار کر لیتا ہے۔

آٹھواں مرحلہ



تیار شدہ کمپوسٹ بیجائی سے پہلے 8 ٹن فی ایکڑ استعمال کرنا چاہیئے



اچھے کمپوسٹ کی نشانیاں

2.6

نہ تیار کمپوسٹ




پیلا یا پیلا بھورا



کچھ اجزاء اصل صورت میں نظر آتے ہیں



پاخانے یا مل موتر کی بو



ہاتھ کو لگتا ہے



60 سینٹی گریڈ سے کم

رنگ

شکل

بو

پانی کی موجودگی

زیادہ سے زیادہ
درجہ حرارت

تیار شدہ کمپوسٹ



گہرا بھورا یا کالا



اصل شکل بمشکل نظر آتی ہے



کمپوسٹ کی بو



ہاتھ کو نہیں لگتا



60 سے 70 سینٹی گریڈ



حل



مسئلہ

ڈھیر کو پرتیں یا ہلائیں



گلے مڑے انڈے کی بو

1


کاربن سے بھرپور مواد
مثلاً گھاس پھونس
یا کاربن کا اضافہ کریں



امونیا کی بو

2


پانی ڈالیں اور ڈھیر کو
ہلائیں



ڈھیر درمیان سے ٹھنڈا یا
خشک ہے

3


ہڈی، گوشت یا ڈیری
اشیاء شامل نہ ہونے
دیں



ڈھیر پر جانوروں کے
کھودنے کے نشانات

4

ناستروجن والا مواد مثلاً
جانوروں کا گوبر یا
باورچی خانے کا بچا
کچا مواد شامل کریں



ڈھیر گیلیا ہے بو بھی ٹھیک
ہے لیکن درجہ حرارت
کم ہے

5



نرسری کے لیے کمپوسٹ

3.1



2 پیننگ کرنا
چھانے گئے کمپوسٹ کو
مناسب سائز کی پلاسٹک
کی تھیلیوں میں پیک کیا
جائے



1 چھانا
تیار شدہ کمپوسٹ میں
سے غیر ضروری مواد یا
ان گلا مواد چھاننے کی
مدد سے نکالا جائے



4 جراثیم کشی-2
بھاپ دینے کے بعد ان
تھیلیوں کو کمرے کے
درجہ حرارت پر ٹھنڈا
ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔



3 جراثیم کشی-1
پلاسٹک کی تھیلیوں میں
پیک کی گئی کمپوسٹ کو
1 گھنٹہ بھاپ کے عمل
سے گزاریں اور پانی نہ
لگنے دیں۔



6 بیجائی کرنا
بیج پنیری والے ٹرے
میں بوئے جائیں



5 بھرائی کرنا
تیار مواد سے پنیری کی
ٹرے بھرنے کے لیے
استعمال کیا جائے






7 پنیری تیار ہونا
صحت مند پنیری
تیار ہوگی اور ہر پودے
کے ساتھ گاجی بھی لگی
ہوگی جس میں پودے
کی جڑیں چھپی ہوئی ہیں



کمپوسٹ کا زمین یا مٹی پر استعمال

3.2



یاد رکھیں!

کمپوسٹ کی افادیت یا فائدے کا مختصر عرصے میں پتہ نہیں چلتا جیسے اگر آپ بیمار ہوں تو آپ کو تندرست ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے کمپوسٹ کا استعمال جاری رکھیں تاکہ زمین زیادہ سے زیادہ زرخیز ہو اور آپ کو اچھی پیداوار دے سکے۔

چار اہم پیغامات

کمپوسٹ کی تیاری کے مراحل بہت سادہ اور آسان ہیں کمپوسٹ کی تیاری کم خرچ ہے اور یہ زمین کو یقینی طور پر زرخیز بناتی ہے۔

مہنگی کیمیائی کھادوں کی بجائے ارد گرد موجود اضافی فضلہ کو استعمال کریں اس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔

کمپوسٹ کے نتائج جلد سامنے نہیں آتے لیکن مسلسل استعمال سے زمین زیادہ زرخیز اور بار آور ہو سکتی ہے، جس سے کیمیائی کھادوں کے استعمال کی ضرورت نہیں رہتی۔

کیمیائی کھاد ایک فوری اثر والی دوا کی طرح پودے کو جلد بڑھا دیتی ہے لیکن مسلسل اور نامناسب مقدار کا استعمال زرخیزی کو کم کرتا ہے اور نتیجتاً کھادوں کی مقدار بڑھانا پڑتی ہے۔

Produced by:

NARC Scientists

under JICA-API/NARC Project for the

**“Capacity Development of Agriculture Extension Services
in Balochistan Province”**

Implemented at: Agriculture Poly-technique Institute (API)
NARC, Islamabad.